



**Русская
Рыбопромышленная
Компания**

Россия, 690001, г Владивосток
ул. Пушкинская, д. 87
Тел : +7 (423) 222 78 78
Факс: +7 (423) 222 78 78
sea@catching.ru
www.catching.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»

/В.А. Литвиненко/

«10 » декабря 2020г.

**СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (РАССЧЕТ НА 1 СУДНО)**

Владивосток, 2020 г.

				<p>мочевыводящих путей - внутрь, 250 мг 1 раз/сут или в/в в той же дозе. При инфекциях кожи и мягких тканей - по 250-500 мг внутрь 1-2 раза/сут или в/в, по 500 мг 2 раза/сут. После в/в введения через несколько дней возможен переход на прием внутрь в той же дозе.</p> <p>При заболеваниях почек дозу снижают в соответствии со степенью нарушения функции: при КК=20-50 мл/мин - по 125-250 мг 1-2 раза/сут, при КК=10-19 мл/мин - 125 мг 1 раз в 12-48 ч, при КК<10 мл/мин - 125 мг через 24 или 48 ч. Длительность лечения - 7-10 (до 14) дней.</p> <p>Применяют местно в форме глазных капель. Взрослым и детям старше 1 года закапывают по 1-2 капле в пораженный глаз(а) каждые 2 ч до 8 раз/сут в период бодрствования в течение первых 2 сут, затем 4 раза/сут с 3-го по 7-й день. Длительность применения составляет 5-7 дней.</p>	
7	Эргоферон	Таблетки для рассасывания	Перорально	<p>Лечение необходимо начинать как можно раньше, при появлении первых признаков острой инфекции по следующей схеме: в первые 2 часа препарат принимают каждые 30 минут, затем в течение первых суток осуществляют еще три приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.</p> <p>Для профилактики вирусных инфекционных заболеваний — по 1-2 таблетки в день. Рекомендуемая продолжительность профилактического курса определяется индивидуально и может составлять 1 — 6 месяцев.</p>	5
8	Изопринозин	Таблетки	Таблетки принимают внутрь после еды, запивая небольшим количеством воды.	<p>Взрослым - по 6-8 таблеток в сутки, детям - по полтаблетки на 5 кг/массы тела в сутки. При тяжелых формах инфекционных заболеваний доза может быть увеличена индивидуально до 100 мг/кг массы тела в сутки, разделенных на 4-6 приемов.</p> <p>Максимальная суточная доза для взрослых 3-4 г/день, для детей - 50 мг/кг/сутки.</p> <p>Продолжительность лечения</p> <p>Острые заболевания: продолжительность лечения у взрослых и детей обычно от 5 до 14 дней. Лечение необходимо продолжать до момента исчезновения клинических симптомов и в течение еще 2 дней уже при отсутствии симптомов. При необходимости длительность лечения может быть увеличена индивидуально под контролем врача.</p>	10
9	Апротинин	Аэрозоль, раствор	Внутривенно капельно или струйно (медленно).	<p>Доза подбирается индивидуально, в зависимости от диагноза, состояния больного и оперативной ситуации.</p> <p>Панкреатит: острый - по 300 тысяч - 10 тысяч КИЕ в сутки в течение 2-6 суток. При обострении хронического панкреатита - 25-50 тысяч КИЕ в сутки.</p> <p>Гиперфибринолитическая коагулопатия: начальная доза - 1 млн, поддерживающая доза - по 50 тысяч КИЕ в час.</p>	10
10	Аминометилбензойная кислота	Раствор	Внутривенно; перорально	<p>В/в струйно 5-10 мл 1% раствора или в/м 100 мг (при остром генерализованном фибринолитическом кровотечении). Для прекращения фибринолиза на фоне лечения стрептокиназой - 50 мг; при развитии синдрома коагулопатии - 50-100 мг или в/м 100 мг, при необходимости возможно повторное введение (не ранее чем через 4 ч). При остром фибринолизе дополнительно вводят фибриноген, контролируя при этом фибринолитическую активность крови и содержание в ней фибриногена.</p> <p>Максимальная разовая доза 100 мг (10 мл 1% раствора).</p> <p>Внутрь после приема пищи, не разжевывая, запивая жидкостью, по 100 мг 3-4 раза в сутки.</p> <p>Местно. От 1/4 части губки до 3-4 губок и более (в зависимости от степени, характера и места кровотечения). После быстрого осушения кусочки губки придавливаются марлевым шариком к кровоточащей поверхности на 3-5 мин. Губку можно поместить в марлевый тампон для рыхлой тампонады полости. Тампон извлекают через 24 ч. При необходимости измельченной губкой покрывают всю раневую поверхность; допускается распыление</p>	10

№ п/п	Наименование препарата	Форма выпуска	Способ употребления	Дозировка для приема	Кол - во упаковки на 1 судно						
1	Рибавирин	Таблетки, Капсулы	Внутрь не разжевывая и запивая водой, одновременно с приемом пищи	Капсулы: 15 мг на 1 кг массы тела, что соответствует 800-1200 мг в день, т.е. 2-3 капсулы или таблетки утром и 2-3 капсулы или таблетки вечером. Таблетки: по 0.8-1.2 г в сутки в 2 приема (утром и вечером).	504						
2	Лопинавир/ Ритонавир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Для приема внутрь. Дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от схемы лечения, предшествующей и одновременно применяемой терапии.	- 400/100 мг (2 таблетки по 200/50 мг) 2 раза в сутки; - 800/200 мг (4 таблетки по 200/50 мг) 1 раз в сутки пациентам с менее чем тремя лопинавир-ассоциированными мутациями. Следует учесть необходимость повышения дозы лопинавира / ритонавира до 500/125 мг (2 таблетки по 200/50 мг и 1 таблетка 100/25 мг) при применении в комбинации с эфавирензом, невирапином, ампренавиром или нелфинавиром у пациентов, ранее получавшими лечение, и в которых можно предусмотреть снижение чувствительности к лопинавиру	50						
3	Рекомбинантный интерферон бета-1b	Флаконы	Инъекции	Через день, в дозе 8 млн МЕ (1 мл). Раствор не встрахивать и использовать сразу. Нежелательны повторные инъекции в один и тот же участок кожи. Лечение длительное (многолетнее). В контролируемых клинических исследованиях эффект лечения интерфероном бета-1b сохранялся в течение 3-х лет наблюдений. Имеются результаты клинических исследований, в которых длительность лечения у больных ремиттирующим и вторично-прогрессирующими рассеянным склерозом достигала 5 и 3 лет соответственно.	20						
4	Амоксициллин/клавуланат (500 дозировка)	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	Перорально	<p>Расчет дозы производят в зависимости от возраста и массы тела, указывают в мг/кг массы тела в сутки либо в миллилитрах суспензии. Суточную дозу делят на три приема через каждые 8 часов. Рекомендуемый режим дозирования (расчет дозы -по амоксициллину) и кратность приема представлены в таблице ниже.</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Суспензия 4:1 (125 мг-31.25 мг/5 мл мг/5 мл) в 3 приема каждые 8 часов</td></tr> <tr> <td>препарата</td><td>20 мг/кг/сут</td></tr> <tr> <td>препарата</td><td>40 мг/кг/сут</td></tr> </table> <p>Низкие дозы препарата рекомендованы для лечения инфекций кожи и мягких тканей, а также рецидивирующего тонзиллита. Высокие дозы препарата рекомендованы для лечения таких заболеваний, как средний отит, синусит, инфекции нижних дыхательных путей и мочевыводящих путей, инфекции костей и суставов.</p>		Суспензия 4:1 (125 мг-31.25 мг/5 мл мг/5 мл) в 3 приема каждые 8 часов	препарата	20 мг/кг/сут	препарата	40 мг/кг/сут	10
	Суспензия 4:1 (125 мг-31.25 мг/5 мл мг/5 мл) в 3 приема каждые 8 часов										
препарата	20 мг/кг/сут										
препарата	40 мг/кг/сут										
5	Левофлоксацин (500 дозировка)	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Перорально	<p>При синусите - внутрь, по 500 мг 1 раз/сут; при обострении хронического бронхита - по 250-500 мг 1 раз/сут. При пневмонии - внутрь, по 250-500 мг 1-2 раза/сут (500-1000 мг/сут); в/в - по 500 мг 1-2 раза/сут. При инфекциях мочевыводящих путей - внутрь, 250 мг 1 раз/сут или в/в в той же дозе. При инфекциях кожи и мягких тканей - по 250-500 мг внутрь 1-2 раза/сут или в/в, по 500 мг 2 раза/сут. После в/в введения через несколько дней возможен переход на прием внутрь в той же дозе.</p> <p>При заболеваниях почек дозу снижают в соответствии со степенью нарушения функции: при КК=20-50 мл/мин - по 125-250 мг 1-2 раза/сут, при КК=10-19 мл/мин - 125 мг 1 раз в 12-48 ч, при КК<10 мл/мин - 125 мг через 24 или 48 ч. Длительность лечения - 7-10 (до 14) дней.</p> <p>Применяют местно в форме глазных капель. Взрослым и детям старше 1 года закапывают по 1-2 капле в пораженный глаз(а) каждые 2 ч до 8 раз/сут в период бодрствования в течение первых 2 сут, затем 4 раза/сут с 3-го по 7-й день. Длительность применения составляет 5-7 дней.</p>	10						
6	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Перорально; в форме капель в глаза	При синусите - внутрь, по 500 мг 1 раз/сут; при обострении хронического бронхита - по 250-500 мг 1 раз/сут. При пневмонии - внутрь, по 250-500 мг 1-2 раза/сут (500-1000 мг/сут); в/в - по 500 мг 1-2 раза/сут. При инфекциях	10						

				шприцем или распылителем.	
11	Гидрокортизон	Раствор	Внутримышечно	<p><i>В/м (глубоко)</i> в ягодичную мышцу в дозе 50–300 мг до 1000–1500 мг/сут. Перед употреблением содержимое ампул необходимо встряхивать до образования гомогенной взвеси.</p> <p>При острых, угрожающих жизни состояниях вводят по 100–150 мг каждые 4 ч в течение 48 ч; затем — каждые 8–12 ч. Детям — каждые 4 ч 1–2 мг/кг, оптимальная суточная доза — 6–9 мг/кг.</p> <p><i>В полость суставов</i> вводят по 5–25 мг (0,1–1 мл (в зависимости от размера сустава) 1 раз в неделю. 3–5 инъекций на курс. Действие препарата начинается спустя 6–25 ч после введения и продолжается несколько дней или недель.</p>	40
12	Рутозид	Таблетки	Перорально	<p>При приеме внутрь в таблетках начальная доза 300 мг 3–4 раза в сутки или 500 мг 2 раза в сутки.</p> <p>Эффект развивается в течение 2 недель. Лечение продолжают в той же дозе или снижают ее до минимальной поддерживающей (600 мг в сутки). После прекращения лечения достигнутый эффект сохраняется в течение 4 недель</p>	50
13	Витамин С	Дражже, таблетки шипучие	Перорально	<p>Внутрь после еды. 1 таблетку растворяют в стакане воды (200 мл). Таблетки не следует глотать, жевать и рассасывать в ротовой полости.</p> <p>Лечение и профилактика гипо- и авитаминоза С: по 250 мг 1–2 раза/сут.</p>	20
14	Раствор электролитов	Раствор	Внутривенно	<p><i>В/в (струйно и капельно)</i> под контролем лабораторных показателей. При тяжелых формах заболеваний (гиповолемический инфекционно-токсический шок, декомпенсированный метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к капельному.</p> <p>При более легких формах заболеваний (интоксикация и обезвоживание организма, метаболический ацидоз, олигурия) можно ограничиваться капельным введением препарата.</p> <p>Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему потерянной жидкости.</p> <p>Соотношение введенной жидкости и диуреза определяют каждые 6 ч. В течение 1 ч вводят раствор в количестве, соответствующем 7–10% массы тела больного; затем струйное введение заменяют капельным, в течение 24–48 ч, со скоростью 40–120 кап/мин.</p>	60
15	Раствор глюкозы	Раствор	Внутривенно	<p><i>В/в капельно.</i> 10% раствор - до 60 кап/мин (3 мл/мин); максимальная суточная доза для взрослых - 1 л. <i>В/в, струйно</i> — 10–50 мл 10% растворов.</p> <p>У взрослых с нормальным обменом веществ суточная доза вводимой декстрозы не должна превышать 4–6 г/кг, т.е. около 250–450 г (при снижении интенсивности обмена веществ суточную дозу уменьшают до 200–300 г), при этом суточный объем вводимой жидкости - 30–40 мл/кг. Детям для парентерального питания наряду с жирами и аминокислотами в первый день вводят 6 г декстрозы/кг/сут, в последующем - до 15 г/кг/сут. Для более полного усвоения декстрозы, вводимой в больших дозах, одновременно с ней вводят инсулин короткого действия из расчета 1 ЕД инсулина на 4–5 г декстрозы. Больным сахарным диабетом декстрозу вводят под контролем ее содержания в крови и моче.</p>	60

Начальник отдела производственной безопасности, охраны труда, и окружающей среды

Р.Г. Суржанский